

# 当院でレカネマブおよびドナネマブを用いた治療を開始しました

令和5年12月20日に認知症抗体医薬「レカネマブ」（販売名：レケンビ®点滴静注）が令和6年12月20日に認知症抗体医薬「ドナネマブ」（販売名：ケサンラ®点滴静注液）が国内で販売開始されました。

国内で初めてのアルツハイマー型認知症の原因を除去する作用を持つ薬です。

## 当院もの忘れ外来のレカネマブおよびドナネマブを用いた治療について

### ○ どんなお薬？

脳内のアミロイドβを抜き取る効果のある薬です。

点滴で投与し、レカネマブは2週間に1回、ドナネマブは4週間に1回投与し、認知症の進行を遅らせる効果が認められています。

※本剤は、他の認知症薬と比べて高価なため、高額療養費制度の対象となる場合があります。

#### ① 受診相談・予約

当院へご相談をいただき、もの忘れ外来の受診予約をとります。

もの忘れのご様子などを聞き取りするため、予約の際には20～30分程度お時間をいただきます。

#### ② 当院受診

**アルツハイマー病による軽度認知障害もしくは軽度認知症**の診断を受け、検査で下記に該当する方

- ・MRI画像検査で動脈硬化が軽い
- ・MMSE-J検査とCDR検査で、軽度の認知症または軽度認知障害である

※受診の結果、投与対象外と判定される場合があります。

#### ③ アミロイドPET検査

②で該当となった方は、他院でアミロイドPET検査を受けていただきます。

アミロイドPET検査で**陽性**になった方が、投与対象となります。

#### ④ 投与開始

③で陽性となった方が、治療開始となります。

※②～④の期間が1ヵ月と定められているため、1ヵ月を超えると②の検査を再度行う必要があります。

## ○ 投与方法

薬剤名	レケンビ（レカネマブ）	ケサンラ（ドナネマブ）
投与間隔	2週間に1回	4週間に1回
投与方法	1時間かけて静脈点滴を行います	30分かけて静脈点滴を行います
	初回投与時に3時間の経過観察が必要なため、1泊入院となります。2回目以降は、日帰り入院となります（2時間の経過観察があります）。	
投与期間	原則18カ月間 ※18カ月以降も継続投与されることもできます	治療開始後12カ月の時点でアミロイドPET検査の結果が陰性化していれば、その時点で投与終了。 ※陰性化していない場合は、原則最大18カ月まで継続します。
	定期的にMRI検査、MMSE-J検査、CDR検査を行い、治療状況の確認をいたします。 <b>※重篤な副作用が出た場合は、連携先の脳神経外科に受診していただきます。</b>	

詳しい内容について知りたい方は、  
当院認知症疾患医療センターまでお問い合わせください。  
TEL：0123-40-7111（直通）

## ○アミロイドPET 検査依頼先医療機関

**市立札幌病院**（札幌市中央区北11条西13丁目1-1）

[市立札幌病院公式ホームページ](https://www.city.sapporo.jp/hospital/)／[市立札幌病院](https://www.city.sapporo.jp/hospital/)

(<https://www.city.sapporo.jp/hospital/>)

## ○脳神経外科 連携先医療機関

**社会医療法人北農会 恵み野病院**（恵庭市恵み野西2丁目3番地5）

[社会医療法人 北農会 恵み野病院](https://megumino.or.jp/)

(<https://megumino.or.jp/>)